

LES MORPHINIQUES A VOTRE DISPOSITION

DCI Et AMM	NOM DE SPECIALITE	DELAI D'ACTION	DUREE D'ACTION	DOSAGE
Chlorhydrate de morphine orale immédiate <i>Toutes douleurs</i>	Sirop Aguetant (Buvable)	30 à 90 mn	4h	Sirop 5mg/ml
Chlorhydrate de morphine injectable ou Sulfate de morphine injectable <i>Toutes douleurs</i>	MORPHINE® (Injectable)	10 min en IV 45 min en ss-cut	4h	Dosages de : 1mg/ml ; 10 mg/ml ; 20 mg/ml 40 mg/ml ; 50 mg/ml Amp. de 1ml, 5ml, 10ml Soit 1mg, 10mg, 20mg, 50mg 100mg, 400mg, 500mg
Sulfate de morphine orale immédiate <i>Toutes douleurs</i>	ORAMORPH® (Buvable)	45 min	4h	Unidose : 10, 30, 100mg dans 5ml + 20 mg dans 1ml : Gouttes
	SEVREDOL® (Comprimé)	1h	4h	cp. à 10 et 20 mg
	ACTISKENAN® (Gélule)	1h	4h	gel à 5, 10, 20 et 30 mg
Sulfate de morphine orale à libération prolongée <i>Toutes douleurs</i>	MOSCONTIN® (Comprimé)	4h	12h	cp. à 10, 30, 60, 100 et 200 mg
	SKENAN® LP (Gélule)	4h	12h	gel à 10, 30, 60, 100 et 200 mg
Oxycodone orale immédiate <i>Douleurs cancéreuses</i>	OXYNORM® (Gélule)	1h	4h	gel de 5, 10 et 20 mg
	OXYNORMORO® (Comprimé)	1h	4h	cp de 5, 10 et 20 mg
Oxycodone chlorhydrate injectable <i>Douleurs cancéreuses</i>	OXYNORM® injectable (Hôpital seulement)	10 min en IV 20 à 30 min ss-cut	4h	Dosage de 10mg/ml, Amp de 1ml Dosage de 10mg/ml, Amp de 2ml Dosage de 10mg/ml, Amp de 20ml Dosage de 50mg/ml, Amp de 1ml
Oxycodone orale à libération prolongée <i>Douleurs cancéreuses</i>	OXYCONTIN® LP (comprimé)	1h	12h	cp de 5, 10, 20, 40, 80 et 120 mg
Hydromorphone orale à libération prolongée (2ème intention) <i>Douleurs cancéreuses</i>	SOPHIDONE® LP (Gélule)	4h	12h	gel de 4, 8, 16 et 24 mg
Fentanyl transdermique <i>Toutes douleurs</i>	DUROGESIC® (Patches)	12h	72h	Patches à 12, 25, 50, 75 et 100 µg/h
	MATRIFEN® (Patches)	12h	72h	Patches à 12, 25, 50, 75 et 100 µg/h
	Fentanyl Générique (Patches)	12h	72h	Patches à 12, 25, 50, 75 et 100 µg/h
Citrates de Fentanyl <i>Douleurs cancéreuses</i>	ACTIQ® (Bâtonnets)	15 min	2h	Bâtonnets de 200, 400, 600, 800, 1200 µg
	ABSTRAL® (comprimé sublingual)	10 min	1h30	Cp. 100, 200, 300, 400, 600, 800 µg
	EFFENTORA® (comprimé gingival)	15 min	1h30	Cp 100, 200, 400, 600, 800 µg
	INSTANYL (pulv. nasales)	10 min	1h	Dosage de 50, 100, 200 µg

LES MORPHINIQUES : COMMENT LES UTILISER ?

COMMENT PASSER DES ANTALGIQUES DE NIVEAU II AUX ANTALGIQUES DE NIVEAU III

DOSES MAXIMALES NIVEAU II		
Codéine-paracétamol 30 mg/500 Dose quotidienne	Dihydrocodeine	Tramadol Dose quotidienne per os
180 mg 6cp	120 mg	400 mg
<p>↓</p> <p>Si patient non calmé : passage aux niveaux III A titre indicatif (Adulte sans insuffisance rénale)</p>		
Sulfate de MORPHINE LP		20 mg à 30 mg X2
Chlorhydrate de MORPHINE (Dose de secours)		5 à 10 mg
Evaluation et ajustement quotidien		

COMMENT INITIALISER UN TRAITEMENT MORPHINIQUE

-Vérifier que la douleur est évaluée et qu'elle est morphino-sensible.

-Si le patient a des antalgiques de niveau II, voir tableau ci-dessus.

-Si le patient est vierge d'antalgique, procéder à une titration*
A titre indicatif : initiation d'un traitement morphinique 1 mg/Kg/J

* Titration : Recherche de la posologie minimum efficace : utilisation d'une morphine à libération immédiate per os ou parentérale, doses successives jusqu'à la dose efficace. Pour en savoir plus, contactez votre correspondant local.

La fédération des EMSP ...



... dans le cadre du réseau

ARESPA

Fédération ALTER - Hôpital Jean Minjot - + 5 Aile Nord
3, boulevard Fleming - 25 030 Besançon CEDEX

Retrouvez cette plaquette en téléchargement sur le site : www.soinspalliatifs-fc.fr